

PROTOCOLO DE SEGURIDAD HEMOSTÁSICA DE LOS PROCEDIMIENTOS ODONTOLÓGICOS EN PACIENTES TRATADOS CON ANTICOAGULANTES

El presente Protocolo Clínico Aceptado por el Ilustre Consejo General de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de España, titulado “Protocolo de seguridad odontológica en pacientes tratados con anticoagulantes” sólo persigue un fin informativo y tiene carácter meramente orientativo, por lo que su aplicación es voluntaria, al mejor criterio del facultativo.

Los procedimientos recogidos en letra redonda son siempre seguros.

Codificación: Los procedimientos destacados en *cursiva* revisten riesgo de sangrado en pacientes anticoagulados.

Los procedimientos destacados en ***negrita cursiva*** no deben ser practicados en pacientes anticoagulados sin un previo ajuste del tratamiento anticoagulante por el hematólogo.

Los procedimientos inscritos en **VERSALITA NEGRITA** no deben realizarse en régimen ambulatorio, debiendo practicarse previo ingreso hospitalario.

PROTOCOLO DE SEGURIDAD HEMOSTÁSICA DE LOS PROCEDIMIENTOS ODONTOLÓGICOS EN PACIENTES ANTICOAGULADOS					
<i>PROCEDIMIENTO</i>	RIN (Ratio Internacional Normalizado)¹ INR (International Normalized Ratio) Valor necesario para intervenciones quirúrgicas electivas: ≤ 2				
	Inferior al rango terapéutico de anticoagulación		Dentro del rango terapéutico Anticoagulante		
	> 1,5	1,5-2	2-2,5	2,5-3	>3
Examen	Procedimiento seguro	Procedimiento seguro	Procedimiento seguro	Procedimiento seguro	Procedimiento seguro
Radiografías					
Toma de impresiones					
Proxilaxis supragingival	Procedimiento seguro	Procedimiento seguro	Procedimiento seguro	Procedimiento seguro	Procedimiento seguro
Obturaciones					
Reconstrucciones complejas					
Conductoterapias	Procedimiento seguro	Procedimiento seguro	Procedimiento seguro	Usar medidas locales	Usar medidas locales
Tallados coronarios					
Exodoncias simples					
Curetajes gingivales	Procedimiento seguro	Procedimiento seguro	Procedimiento seguro	Usar medidas locales	Usar medidas locales
Gingivoplastias					
Exodoncias múltiples simples de un cuadrantes					
Exodoncia diente incluido	Procedimiento probablemente seguro	Procedimiento probablemente seguro	Procedimiento probablemente seguro	Procedimiento inseguro: enviar a hematólogo	Procedimiento inseguro: enviar a hematólogo
Gingivectomía					
Cirugía Periodontal					
Apicectomía	Procedimiento probablemente seguro	Procedimiento probablemente seguro	Procedimiento inseguro: enviar a hematólogo	Procedimiento inseguro: enviar a hematólogo	Procedimiento inseguro: enviar a hematólogo
Colocación de implante					
Cirugía de colgajos amplios					
Extracción múltiple de dientes incluidos	Procedimiento probablemente seguro	Procedimiento probablemente seguro	Procedimiento inseguro: enviar a hematólogo	Procedimiento inseguro: enviar a hematólogo	Procedimiento inseguro: enviar a hematólogo
Colocación de múltiples fijaciones					
Edentulación completa de una arcada					
Edentulación completa simultánea de ambas arcadas	Procedimiento probablemente seguro	Usar medidas locales	Procedimiento inseguro: enviar a hematólogo	Procedimiento inseguro: enviar a hematólogo	Procedimiento inseguro: enviar a hematólogo
REDUCCIÓN DE FRACTURAS ABIERTAS	PROC. HOSPITALARIO	PROC. HOSPITALARIO	PROC. HOSPITALARIO	PROCEDIMIENTO HOSPITALARIO	PROC. HOSPITALARIO
CIRUGÍA ORTOGNÁTICA	PROC. HOSPITALARIO	PROC. HOSPITALARIO	PROC. HOSPITALARIO	PROCEDIMIENTO HOSPITALARIO	PROC. HOSPITALARIO

¹ El RIN es el cociente entre el tiempo de protrombina del paciente y el tiempo de un laboratorio estándar o de referencia. Es el inverso de la tasa de protrombina.